

دور تقصي لطاخات عنق الرحم في التشخيص المبكر للآفات

ميسلون محمد العاني^١، عبدالحسين الهادي^١، فائزة عفتان الراوي^٢

الخلاصة

خلفية الدراسة: تعتبر لطاخة بابانيكولاو لعنق الرحم من أكثر وسائل التقصي فاعلية لمنع سرطان عنق الرحم هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى ايجاد معدل الانتشار للآفات الالتهابية و ما قبل الخبيثة والخبيثة بين النساء و تحديد العوامل المتعلقة بمعدل انتشار هذه الآفات طريقة العمل: اجريت دراسة مقطعية على مدى ثلاثة اشهر شملت ٣٠٢ امرأة مراجعة للعيادة الخارجية للنسائية و التوليد . تم استحصال المعلومات من كل مريضة و اجريت بعدها لطاخة عنق الرحم بعد اخذ موافقة المريضة النتائج: كانت معدلات الانتشار للآفات المختلفة كالآتي؛ التهاب عنق الرحم غير النوعي ١٨٨ (٦٢.٧٪)، الحؤول الصدفي ٢٣ (٧.٧٪)، داء المبيضات ١١ (٣.٧٪)، الثدن الصدفي ٧ (٢.٣٪)، المشعرات المهبليّة ٤ (١.٣٪)، حمة الحليموم البشري ٤ (١.٣٪)، اما الآفات الناتجة من اللولب الرحمي لمنع الحمل فكانت ٤ (١.٣٪). اثنان من اللطاخات كانت غير كافية و قد استثنيتا من الدراسة الاستنتاج: كانت معدلات الانتشار للآفات المختلفة مقارنة للدراسات الاخرى. و لقد تبين وجود علاقة ذات معنى احصائي بين لطاخات عنق الرحم الالتهابية و بين المستوى الثقافي المنخفض، اتباع ممارسات تصحح خاطئة، حدوث التهابات تناسلية سابقة، و وجود اجهاض و تجريف رحمي سابق .

مفتاح الكلمات: لطاخات عنق الرحم، سرطان عنق الرحم، التهاب عنق الرحم

^١ فرع طب المجتمع (كلية الطب- جامعة النهرين)

^٢ فرع الباثولوجي (كلية الطب- جامعة النهرين)