

### شيوخ مرض باركنسن في منطقة الكاظمية من مدينة بغداد عبد المطلب عبد الكريم<sup>١</sup>، أمجد نيازي<sup>٢</sup>، عمار فاضل<sup>٣</sup>

#### الخلاصة

خلفية الدراسة: مرض باركنسن هو أكثر الأمراض المزمنة النمطية التي تصيب الجهاز العصبي، يصيب الأفراد من الأعمار أكثر من ٤٠ سنة. دراسة شيوخ المرض يشكل ركيزة أساسية للتخطيط الطبي خصوصاً أن أعمار الأفراد في معظم المجتمعات في تزايد. هناك بعض الاختلافات في نسبة شيوخ المرض في المجتمعات المختلفة في العالم و النسبة غير معروفة في بلادنا.

هدف الدراسة: معرفة نسبة الإصابة بالمرض في منطقة الكاظمية.

طريقة العمل: الدراسة معتمدة على الكتلة الاجتماعية أقيمت بشكل مسحي بمشاهدة المرض مرة واحدة من العينة التي أختيرت عشوائياً من المنطقة. المرضى الذين يشك في أصابتهم بالمرض يحالون الى المستشفى التعليمي في الكاظمية لغرض تثبيت التشخيص بهذا المرض من قبل اختصاصي طب الجملة العصبية. المرض يشخص سريرياً و تدرس الحالة لإستبعاد الاحتمالات الأخرى.

النتائج: ٢٥ مريض مصاب بمرض باركنسن جمعت من عينة عشوائية ل (٢٢٩٨٨) شخص (١٣ ذكور و ٢٣ أنثى). (٦) من منطقة ريفية و (١٩) من منطقة حضرية. ثلاث حالات شخصت لأول مرة. الارتعاش هو أكثر العلامات شيوعاً (٨٠٪). (١٩) مريض الإصابة كانت في الجهتين على الرغم من أن بداية المرض كانت في جهة واحدة. نسبة شيوخ المرض تزداد بتقدم الأعمار. نسبة شيوخ المرض كانت ١٠٨,٧٥ لكل ١٠٠٠٠٠ شخص. عند الأنثى كانت ١٠٣ لكل ١٠٠٠٠٠ شخص و عند الذكور ١١٤ لكل ١٠٠٠٠٠ شخص. النسبة كانت ١١٤,٣ لكل ١٠٠٠٠٠ شخص للسكان في مناطق حضرية و ٩٤,٣ لكل ١٠٠٠٠٠ شخص للسكان في الريف. الاستنتاج: نسبة شيوخ المرض في بلادنا اقل بقليل من الولايات المتحدة و اوربا لكنها أكثر بقليل من افريقيا و الصين. النسبة تزداد بتقدم العمر. و لا يوجد فرق مهم في نسبة الشيوخ بين الأنثى و الذكور او بالنسبة للسكن في الريف او الحضر. هذه النسبة يمكن ان تعطى لعموم بغداد و ذلك لتشابة بغداد و الكاظمية من حيث التركيبة السكانية.

مفتاح الكلمات: مرض باركنسن، شيوخ

<sup>١</sup> فرع الطب الباطني (كلية الطب- جامعة النهرين)  
<sup>٢</sup> الهيئة العراقية للأختصاصات الطبية  
<sup>٣</sup> مستشفى الحلة العام