

ورم الغدة الصعترية دراسة سريرية مرضيه في العراق

رنا زهير ناجي^١، فائزه عفتان زغير الراوي^٢

الخلاصة

خلفية الدراسة: ورم الغدة الصعترية هو ورم الخلايا الطلائية للغدة الصعترية بغض النظر عن وجود او عدد الخلايا اللمفاوية في الغدة الصعترية

هدف الدراسة: دراسة سريرية مرضيه لورم الغدة الصعترية.

المواد و طرق العمل: دراسة استرجاعية لـ ٥١ حالة من حالات ورم الغدة الصعترية و التي جمعت من مختبرات التحليل النسيجي العامه و الخاصه للفترة من كانون الثاني ١٩٩١ – تشرين الاول ٢٠٠٤.

النتائج: من مجموع ٥١ حالة كانت هناك ٨ حالات (١٥.٦%) ورم الغدة الصعترية الحميد و ٤٣ حالة (٨٤.٤%) ورم خبيث تم تشخيص ٢٨ حالة (٥٤.٩%) مصابه بداء الوهن العضلي الوبيل حيث كانت نسبة الذكور أعلى من الاناث بنسبه ١.٥ : ١ الاشكال النسيجية لورم الغدة الصعترية الاكثر شيوعا هي: ب٢ (٣٥.٣%) ، ب٣ (٢١.٦%) ثم ب١ (١٩.٦%) و أ (١٥.٧%) و أب (٧.٨%) أكثر الاشكال النسيجية شيوعا في الذكور هي ب٢ (٢٧.٥%) و في الاناث الشكل أ و ب١ (١١.٨%) لكل منهما.

الاستنتاجات: هناك علاقة ذات أهميه بين الاشكال النسيجية المختلفه لورم الغدة الصعترية و جنس المريض كذلك بين الاشكال النسيجية و درجه ارتشاح الورم كذلك وجد إن أكثر من نصف المرضى مصابين بداء الوهن العضلي الوبيل في الذكور أعلى بمره و نصف من الاناث

مفتاح الكلمات: أورام الغدة الصعترية داء الوهن العضلي، نظام التصنيف لأورام الغدة الصعترية.و أورام المنصف الصدري.

^١ مختبر الصحة المركزي- بغداد

^٢ فرع علم الأمراض [كلية الطب – جامعة النهرين]