

بعض النواحي التشخيصية لمرض داء الزلاق البطني (حساسية الحنطة) لدى الأطفال في العراق

هالة سامح عمار¹ , راجي المديهي² , سرمد محمد الآله²

الخلاصة:

خلفية الدراسة: هناك ازدياد ملموس لوجود مرض الزلاق البطني في مختلف أنحاء العالم, والبحوث مستمرة لتلافي المشاكل التشخيصية لهذا المرض.

هدف الدراسة: دراسة مجموعة من الأطفال ذوي داء الزلاق البطني والمشاكل التشخيصية لهذا المرض.

طرق العمل : تم تقصي 93 حالة من الأطفال الذين كانوا يعانون من مرض سوء الامتصاص في الأمعاء, بواسطة التحاليل السيروتولوجية وخزعة الأمعاء الدقيقة, لوجود مرض حساسية الحنطة.

النتائج: 58 من 93 من المرضى وجدوا مصابين بمرض حساسية الحنطة حسب الفحص النسيجي لخزعة الأمعاء الدقيقة. تراوحت حساسية الفحوص السيروتولوجية لوجود المرض بين 50 – 70 %. المرضى الذين كانوا يعانون من تغيرات نسيجية شديدة أعطوا ايجابية أكثر في الفحوص السيروتولوجية مع مستويات أعلى من الأجسام المضادة في هذه الفحوص من سواهم. وجدت إحدى عشر حالة من عينة المرضى الكلية , مصابون بطفيلي الجيارديا, وأعطى العض منهم تغيرات متفاوتة في الفحص النسيجي والفحوص السيروتولوجية.

الاستنتاجات: هناك وجود ملحوظ لمرض حساسية الحنطة في العراق. نشترك مع الآخرين في المعاناة من وجود بعض المشاكل التشخيصية, بالإضافة لوجود مشاكل أخرى في التشخيص تخص المرضى في الدول النامية, مما يدعو لإيجاد إستراتيجية خاصة للتشخيص في هذه المناطق.

مفتاح الكلمات: مرض الزلاق البطني, الفحوص السيروتولوجية , الأمراض النسيجية.

¹ فرع طب الأطفال [كلية الطب _ جامعة النهرين]

² فرع علم الأمراض [كلية الطب _ جامعة النهرين]