

## محمد الكريم جاسم محمد البهادلي , أريج محمد العباس

### الخلاصة

**الهدف من الدراسة:** الحصبة مرض انتقالي حاد، واسع الانتشار في سن الطفولة، يتسبب عن الإصابة بفيروس الحصبة، ويتميز بارتفاع في درجة الحرارة مصحوب برشح وسعال ورمد، ويتبع ذلك طفح على جميع أجزاء الجسم.

**مهدف الدراسة:** لغرض معرفة حجم انتشار مرض الحصبة في مدينة بغداد- الكاظمية مع دراسة أسباب هذا الانتشار واهم المضاعفات التي رافقت المرض.

**طريقة البحث:** الدراسة شملت 494 مريض تم تشخيصهم سريرياً في كل من مستشفى الكاظمية التعليمي , مستشفى أطفال الكاظمية ومركزين من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الكاظمية وتم تقسيمهم إلى أربع مجاميع حسب الفئات العمرية (أقل من سنة واحده-من سنة إلى أربع سنوات -من خمس سنوات إلى تسع سنوات- عشر سنوات فما فوق ) وتمت معرفة حالة التحصين ضد مرض الحصبة من خلال فحص سجل التحصين الخاص بالمريض أو من خلال الاستفهام من الوالدين , إضافة إلى اعتماد المعايير الطبية السريرية من أجل تسجيل المضاعفات.

**النتائج:** أظهرت الدراسة معدل الإصابة عند الذكور (49.80 %) يكاد يكون مقارب للإصابة عند الإناث (50.20 % ) , وكان عدد المصابين بالمرض بحسب الفئات العمرية كالآتي: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة 97 (19.64 % ) , من عمر سنة إلى أربع سنوات 287 (58.97 % ) مما يدل على أن عدد الأطفال المصابين بالمرض والذين تقل أعمارهم عن الأربع سنوات 384 (78.61 % ) , كانت نسبة الأطفال المحصنين ضد المرض (10.53 % ) , أظهرت الدراسة أن أهم المضاعفات التي رافقت المريض كانت كالآتي , ذات الرئة , إسهال مع تقيؤ , التهاب الحنجرة والتهاب الدماغ وحسب النسب الآتية (83.85 % ) , (11.46 % ) , (2.60 % ) و (2.09 % ) لكل واحد منهما وحسب التسلسل وكانت نسبة الوفيات (2.43 % ) والتي حدثت معظمها في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الأربع سنوات (91.7 % ) وهناك زيادة طفيفة في نسبة الوفيات عند الذكور (58.4 % ) مقارنة بالإناث (41.6 % ) ز

**الاستنتاج:** الفئات العمرية التي تقل أعمارها عن الأربع سنوات هي أكثر إصابة بمرض الحصبة الذي كان انتشاره بسبب قلة التحصين ضد المرض واهم وأكثر المضاعفات هو مرض ذات الرئة كما أن نسبة الوفيات كانت نسبة قليلة بصورة عامة .

**مفتاح الكلمات:** الحصبة , التحصين, انتشار, مضاعفات, أطفال .

فرع طب الأطفال [كلية الطب \_ جامعة البصرة]

المجلة العراقية للعلوم الطبية 2009 , المجلد 7 العدد 3 ص 46-51

تأثير إضافة وسط تحضير النطفه معزلاً بفيتامين E أو فيتامين C على موانعها السائل

المؤلف: لمؤرخى العقم المصابين بقلة حركة النطفه

باسم خميس كوتبي