خلفية الدراسة: المرضى المصابين بالنقص الوراثي لعوامل التخثر في البلازما يعانون من نزف متكرر مدى الحياة في المفاصل, العضلات، والأماكن المغلقة في الجسم أما بشكل أني أو بعد التعرض لجرح

هدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى بيان الواقع الاجتماعي والديموغرافي للمرضى المصابين بأمراض نزف الدم الوراثية المراجعين لمركز الأمراض النزفية الوراثية في مستشفى المنصور التعليمي للاطفال في بغداد.

طريقة الدراسة :أجريت دراسة مقطعية في الفترة مابين الأول من شهر آذار لسنة ٢٠٠٨م ونهاية شهر آب لسنة ٢٠٠٨م وكانت عينة الدراسة تتألف من 243 مريضا مصابين بمختلف الأمراض النزفية الوراثية. تضمنت البيانات استبيان منظم مليء فقط من قبل الباحث بواسطة الاستجواب للمريض أو والديه أو ذويه المقربين.

النتائج: أظهرت الدراسة الحالية مايلي:

المرضى المصابين بالهيموفيليا ومرض فون ويلليبراند يشكلون ٩٠,١٪ من عينة الدراسة ، كان معدل العمر لمرضى العينة حوالي ١٤سنة، كان حوالي ٧٧٪ من عينة الدراسة من سكنة محافظة بغداد. بعض عوائل المرضى ١٥,٦٪ لديهم ثلاثة أفراد أو أكثر يعانون من احد الأمراض النزفية الوراثية. معظم حالات الهيموفيليا التي راجعت مركز الأمراض النزفية الوراثية كانت أما شديدة أو متوسطة الشدة ٦٦,٥٪ و ٢٢,٥٪ على التوالي. بالنسبة للمرضى الذين أعمارهم ٧ سنوات أو أكثر، فان ٤١٪ منهم لم يلتحقوا بالمدرسة أو تركوا المدرسة بسبب مرضهم الذي يعانون منه. بالنسبة للمرضى الذين أعمارهم ١٨ سنة أو أكثر. كان٦٨,٤ % غير متزوجين، ٤٥,٠٧٪ كانوا عاطلين عن العمل بسبب المرض. العلاجات وخاصة عوامل الدم المصنعة كانت متوفرة لمعظم المرضى(٩٧,١٪).

الاستنتاج: كانت الظواهر الاجتماعية والديموغرافية لمرضى النزف الوراثي في الدراسة مشابهة للدراسات الأخرى في منطقة حوض بحر الأبيض المتوسط وبلدان الغرب, فيما عدا معدل العمر في هذه الدراسة كان اقل من الدراسات الأخرى. صنف الدم لم يؤشر بعلاقة ايجابية مع مختلف انواع مرض النزف الوراثي، كما ان الأصابة بالمرض كان له تأثير سلبي على مستوى التعليم عند المرضى

مفتاح الكلمات : دراسة مرض النزف الوراثي في مدينة بغداد

[1] فرع طب المجتمع [كلية الطب _ جامعة النهرين]

[2] مدينة الطب _بغداد_العراق

المجلة العراقية للعلوم الطبية 2009 م المجلد 7 العدد3 ص94-106

الردبة الإحليلية بعد قص الاحليل بالناظور " تقرير حالة "

علا محمد الكواز

الخلاصة